

ご用命・お問い合わせ先
アペックス産業株式会社
電話 03-3455-6474
FAX 03-3455-6558

＜詳しいご案内は当社のホームページをご覧ください＞
URL <http://www.apex-sangyo.jp>

●切り取って保存してご利用ください。
キリトリ線

APEX CLUB

アペックス産業株式会社

'10/6
第29号


『APEX CLUB』

発行 2010年6月1日(通算29号)
発行所 アペックス産業(株)「APEX CLUB」編集委員会
〒105-0014 東京都港区芝2-23-4
電話 03-3455-6474 FAX 03-3455-6558
ホームページ <http://www.apex-sangyo.jp>
発行人 元木 貢 (編集委員)山口力広、高塚章夫
佐々木 健
(事務局)田口久美

ギャラリー

写真／黒鳥 撮影者・矢内彦四郎

★矢内彦四郎さん。77歳。アマチュアカメラマン。練馬区の石神井公園近くに在住。奥様に先立たれて以来、カメラを趣味に日々を過ごしておられる。平成22年1月20日、石神井公園に黒鳥が飛来しているのを発見し撮影に成功した。極めて珍しい写真である。



★黒鳥ひとくちメモ

黒鳥(ブラックスワン)、カモ目カモ科。オーストラリア(タスマニア地方)に生息する固有種。全長110cm~140cm。体重5kg~9kg。くちばしが赤く、先端付近に白色の斑点がある。大抵、湖の浅瀬か岸辺に草を積み上げて巣を作り、オスとメスで巣を守る。渡り鳥ではなく、同じ所に留まる留鳥。

吸血昆虫の餌

害虫防除という仕事では、吸血昆虫に対応することもあります。

依頼の中心はダニ類がほとんどですが、近年トコジラミやシラミの依頼が増加してきました。

現場ではトコジラミを確認して防除を行っている私たちですが、実際に被害のあったお客様の言う「痒い」というのはどんなものなのか？自分たちで飼育し、吸血させてみました。

現場で採集してきたトコジラミを研究室で飼育し「餌」として作業員の腕の吸血に挑戦！一匹を腕の内側に乗せてみると、すぐに細い口吻を皮膚に突き刺してきます。痛いのかと思いきや、これがまったくチクリともしません。

普段トコジラミは人が眠っている隙に吸血しますが、なるほどこれでは刺されても気が付かないはずで、吸血中、腕が動くとも一度口吻を皮膚から離すので、一匹の吸血跡が数箇所できることもあります。

しばらく吸血させていると、トコジラミのお腹がパンパンに膨れてきました。トコジラミは飢餓に強く、

一ヶ月以上吸血しなくても生存できます。吸血された箇所は、直後は痒くもなんともありませんでしたが、しばらくすると小さく腫れ、痒くなってきました。

その後一週間くらいは痒くなったが治まったりを繰り返して、皮膚に薄く黒ずんだ跡を残しました。

シラミは実験用のコロモジラミが手に入ったので、これも吸血に挑戦！黒い布にわんさか集まっているコロモジラミを布ごと腕に乗せてみます。

するとパチパチツツとした痛みが...皮膚を噛んでいるような感触です。シラミはトコジラミとは全く別の昆虫で、トコジラミに比べて非常に短い口吻を持ちます。体が吸血に慣れていないせいか、トコジラミの時と同様に一週間くらいは痒かったり治まったりを繰り返しました。

コロモジラミは毎日うまく吸血させないとすぐ死んでしまいます。飼育がなかなかうまくいかず、ついには全滅してしまいました。

今回、作業員も痒みの被害を体験しましたが、一度吸血させると一週間痒みが続くのが辛いとの意見が...。人によって痒くなり始める時間もまちまちなので、普段の生活の中ではいつ刺されたのかを特定するのも難しいなと感じました。

虫めがね

昨年の十二月二十一日に当社は創立六十周年を迎えました。多くの取引先、関係者の方々から祝福していただき、改めて六十周年の重みを実感した次第です。これを契機に、社員全員で企業ビジョン、行動基準十四か条を作り、百周年に向かって毎日唱和しています。六十周年キャンペーンの一環として、お客様を訪問、感謝の意をお伝えするとともに、5S運動を展開、社内整備に努めました。

また、キャンペーンクイズでは、多くの方々に応募いただき心から感謝申し上げます。毎月定例の全社会議の席上で厳正な抽選の結果、六十名の方が当選されました。おめでとうございます。引き続きご愛顧のほどお願い申し上げます。



A賞に当選された関根一夫氏

おじゃま虫

Q&A

アメリカカンザイシロアリ
糞

Q アメリカカンザイシロアリはどんなシロアリですか？
A アメリカ原産で主に乾材(かんざい)を食害するシロアリです。在来種のイエシロアリ・ヤマトシロアリが主として床下部材にコロニーを作るのに対し、アメリカカンザイシロアリは屋根裏や家具などにも作ります。

Q 日本での被害はいつ頃からですか？
A 一九七六年に江戸川区で被害報告がありました。北米からの輸入家具材とともに移入したと思われる。現在では日本各地で被害が確認されています。

Q どのようにして、家屋に来るのですか？
A 在来種のイエシロアリ・ヤマトシロアリは土中から侵入しますが、アメリカカンザイシロアリは六月〜九月に群飛を行い、直接家屋の屋根等に飛来します。

Q 家屋のどのような箇所(被害)が多いですか？
A 屋根部材(垂木・軒・野地板・梁等)、外構部材(戸袋・外壁等)、室内部材(窓枠・柱等)です。

Q 防ぎ方方法がありますか？
A 在来種の場合は侵入箇所の土壌部、基礎部等を薬剤処理することで防ぐことができますが、アメリカカンザイシロアリは侵入箇所の特定が難しいため防除は困難です。

Q 駆除方法がありますか？
A 燻蒸処理は百万円位かかる上、日本のような家屋密集地には適していません。現在は被害部位の調査、被害部位への薬剤処理という方法で駆除していますが、数回繰り返す必要があります。

Q 糞が一ミリ程の顆粒状で黒または茶色をしており、木材の穿孔穴から排出するため盛り塩のように積もっていることが多いので発見しやすいです。天井裏や外周部にこのような糞を発見したら、すぐに専門業者に調査を依頼してください。早期発見が家を守ります。