

APEX News No.3

ヤスデ・ムカデ対策をしましょう。

ヤスデ 発生時期:5月～10月くらいまで

ヤスデは野外の落葉や朽木の中、石や倒木の下に生息し腐植質を食べていますので、自然界においては分解者で益虫となります。

しかし、ヤスデ類は見た目の不気味さと、大量発生すること、踏むと異臭を発生するなど、不快害虫として問題となることがあります。特に梅雨時期に大発生したものが、ブロック塀に群がったり、壁面を登り、窓や換気扇などの隙間から家屋内に侵入してきて、大きな問題となります。



ヤケヤスデ



ヤスデの集団発生

ムカデ 発生時期:4月～11月くらいまで

ムカデは、石やコンクリートの隙間、落ち葉や植木の下等、暗く湿ったところに生息しています。

日本では、トビズムカデやアオズムカデ、アカズムカデ等が代表的な生息種です。

肉食性で、他の昆虫を捕食するため、餌を求めて屋内に侵入することがあります。

ヤスデと違って、ムカデは毒を持っていますので、咬まれると激しい痛みやしびれが起こり、重症化した場合、リンパ節炎等を起こします。ハチと同じで、過去に咬まれたことのある人はアナフィラキシーショックが起こることもあります。



トビズムカデ



卵を抱くムカデ

駆除や予防:薬剤で行います。

1. 屋内に侵入させないためには、粉剤や液剤を外周に、面状または帯状に散布します。
2. 侵入してきた個体を駆除するには、エアゾール殺虫剤を噴霧して駆除します。
3. 多数生息が見られる場合は、個人での駆除は困難ですので、弊社へご相談ください。



粉剤散布状況



同左

●使用薬剤



シットアウト SE(3kg 入)
粉剤

ピレスロイドとカーバメイト系の成分の粉剤
家の周囲に 5~10cm 幅の帯状か 1㎡あたり 20~30g の面状に散布します。



サイバーレ 0.5SC(1.8ℓ入)
液剤

ピレスロイド系殺虫剤で、水で 20 倍に薄めて使用します。1 本あたり 720㎡処理できます。



エヤローチ A(420ml)
エアゾール剤

そのまま使用できます。ピレスロイド系殺虫剤で、残効性と隙間からの追い出し効果が期待できます。

発行 アペックス産業株式会社

〒105-0014 東京都港区芝 2-23-4

TEL:03-3455-6474 FAX:03-3455-6558

URL:<http://www.apex-sangyo.jp>